



## Krzywe i połamane

Joanna JASZUŃSKA

Oto kilka zadań związanych z istnieniem i własnościami pewnych krzywych lub łamanych na płaszczyźnie i w przestrzeni trójwymiarowej.

1. Mamy dwa ziemniaki. Wykaż, że istnieje taka krzywa zamknięta w przestrzeni trójwymiarowej, którą da się narysować na powierzchni każdego z tych ziemniaków.

2. Danych jest 9 punktów rozmieszczonych w wierzchołkach, środkach boków i środku kwadratu  $2 \times 2$ , jak na rysunku 1. Połącz wszystkie te punkty za pomocą łamanej złożonej z czterech odcinków.

3. Czy istnieje w przestrzeni taka łamana zwyczajna zamknięta, której żaden z rzutów na płaszczyznę w ustalonych trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach nie zawiera łamanej zamkniętej?


4. Pewnego poranka o godzinie  $8^{00}$  turysta wyruszył z domu u podnóża góry i o  $20^{00}$  dotarł do schroniska na szczycie. O  $8^{00}$  następnego dnia wyruszył ze szczytu tą samą trasą i o  $20^{00}$  wrócił do domu. Udowodnij, że istnieje taki punkt, w którym turysta był w oba dni dokładnie o tej samej godzinie.

5. W przestrzeni dana jest łamana zwyczajna zamknięta złożona z sześciu równych długości odcinków, przy czym odcinki pierwszy i czwarty, drugi i piąty oraz trzeci i szósty są parami równoległe. Ponadto każde dwie proste zawierające kolejne odcinki łamanej tworzą kąty płaskie równe  $120^\circ$ . Czy łamana ta musi być sześciokątem foremnym?


6. Robaczek wgrzył się w idealnie kuliste jabłko o średnicy 1, wydrążył w nim cieniutki tunelik o długości 0,9 i o sobie tylko znanym kształcie i wyszedł na powierzchnię w innym punkcie. Wykaż, że można to jabłko tak przeciąć na pół, by w jednej z połówek nie było śladów bytności robaczka.



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3. Turysta mógł zmieniać tempo marszu, robić postoje, a nawet się cofać.

Elipsoida obrotowa o ogniskach  $F, G$  i stałej  $d$  to zbiór takich punktów  $X$  przestrzeni, dla których  $XF + XG = d$ . Punkty  $X$ , dla których  $XF + XG < d$ , tworzą wnętrze elipsoidy. Elipsoida jest figurą wypukłą.

Literatura:  
Peter Winkler, *Mathematical Mind-Benders*, A K Peters 2007

### Rozwiązania

**R1.** Zamiast ziemniaków rozważmy ich duchy o dokładnie tym samym kształcie i rozmiarze. Wystarczy teraz, by jeden duch częściowo przeniknął przez drugiego. Przecięcie ich powierzchni wyznacza szukaną krzywą.  $\square$

**R2.** Startując ze środka lewego boku rysujemy w górę odcinek o długości 2 (wystaje on więc poza kwadrat); następnie w prawo w dół odcinek przechodzący przez środki górnego i prawego boku i kończący się na poziomie dołu kwadratu; potem w lewo poziomy odcinek o długości 3, kończący się w lewym dolnym rogu kwadratu; i wreszcie czwarty odcinek łamanej – przekątną kwadratu (w prawo w górę).  $\square$

**R3.** Tak, przykład takiej łamanej zaprezentowano na rysunku 2. Znajduje się ona na powierzchni pewnego sześciokąta, a przedstawione jej rzuty są w kierunkach zgodnych z krawędziami tego sześciokąta.  $\square$

**R4.** Narysujmy wykresy obu wędrówek turysty (rys. 3). Jedna z nich to krzywa łącząca dwa przeciwległe wierzchołki prostokąta, druga zaś łączy pozostałe dwa wierzchołki. Takie dwie krzywe muszą się gdzieś przeciąć, co kończy dowód.  $\square$

Aby nieco ściślej uzasadnić przecinanie się krzywych, można wykorzystać np. własność Darboux i zadanie 1 z *deltoidea* 12/2010. Inne rozwiązanie opisano w *deltoidea* 11/2014.

**R5.** Nie musi. Rozważmy ośmiościan foremny o parach przeciwległych wierzchołków  $A$  i  $A'$ ,  $B$  i  $B'$ ,  $C$  i  $C'$ . Łamana  $ABCA'B'C'A$  spełnia warunki zadania. Odpowiednie odcinki są równe, bo ośmiościan jest foremny i równoległy, bo  $ABA'B'$ ,  $ACA'C'$ ,  $BCB'C'$  są kwadratami. Ściany tego ośmiościanu są trójkątami równobocznymi, więc wszystkie pary kolejnych prostych tworzą kąty  $120^\circ$ .  $\square$

**R6.** Rozważmy elipsoidę obrotową o ogniskach w punktach wejścia i wyjścia robaczka oraz o stałej równej 0,9. Każdy punkt tuneliku odległy jest od jego końców w sumie o najwyżej 0,9, więc cały tunelik mieści się w elipsoidzie. Z kolei środek jabłka jest poza nią, gdyż suma jego odległości od ognisk równa jest  $0,5 + 0,5 = 1 > 0,9$ . Istnieje więc taka płaszczyzna przechodząca przez środek, że cała elipsoida jest po jednej jej stronie. Wtedy po drugiej stronie otrzymujemy nietkniętą przez robaczka połówkę jabłka.  $\square$