

# Porównywanie wież potęgowych

Karol GRYSZKA\*

\* Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

**Zadanie.** Używając dowolnych cyfr oraz operacji  $+$ ,  $-$ ,  $\cdot$ ,  $/$ , potęgowania i nawiasów, należy zapisać działanie o możliwie największym wyniku. Czas na zapisanie działania to 10 sekund.

Liczba  $9 \uparrow 3 = 9^{9^9}$  ma w rozwinięciu 369 693 100 cyfr. Więcej o dużych liczbach i „wykładnikach strzałek” można znaleźć w *Delcie* 3/2008.

Zwróćmy uwagę, że kolejność wykonywania działań oraz sposób zagnieżdżania notacji w sobie samej ma znaczenie, np.

$$[[3; 3]; 3] = (3^3)^3 < 3^{3^3} = [3; 3; 3].$$

Prosty przykład normalizacji wieży:  
 $[4 \times 3] \approx [10; 154,127] \approx [10; 10; 2,188].$

Wszystkie wartości numeryczne zostały uzyskane z wykorzystaniem pakietu WolframAlpha.

Zamiast  $\log_{10} x$  w tekście stosowane jest  $\log x$ .



Drogi Czytelniku, z dużym prawdopodobieństwem zapisałeś coś takiego  $9^{9^{\dots^9}}$ , czyli *wieżę potęgową*. Działanie  $a^{a^{\dots^a}}$  oznaczmy przez  $a \uparrow b$ , gdzie  $b$  oznacza, ile razy liczba  $a$  pojawia się w wieży. Możemy rozważyć również wieże, w których kolejne „piętra” nie są taką samą liczbą. Wprowadźmy następującą notację:

$$a_1^{a_2^{\dots^{a_n}}} = [a_1; a_2; \dots; a_n].$$

Przyjmijmy, że wszystkie liczby w wieży, poza ostatnią, muszą być całkowite i niezerowe. Wartość  $n$  nazywamy wysokością wieży. Ponadto zastosujemy następujące uproszczenie: jeżeli liczba  $a$  pojawia się w wieży  $k$  razy pod rząd, to będziemy to oznaczać przez  $a \times k$ , na przykład:

$$3^{3^{3^3}} = 3 \uparrow 4 = [3; 3; 3; 3] = [3 \times 4], \quad 3^{5^{5^{5^5}}} = [3; 5 \times 4].$$

W tym artykule zajmiemy się takimi właśnie wieżami. Dokładniej, jak już mógł zdradzić tytuł, będziemy starali się wskazać sposób porównywania wież.

Zacniemy od znalezienia ogólnego sposobu na zapisanie wyrażenia  $[a_1; a_2; \dots; a_n]$  za pomocą wieży  $[10 \times k; y]$ , gdzie  $k > 0$  jest naturalne, a  $y \in [1, 10)$ , czyli

$$[a_1; a_2; \dots; a_n] = [10 \times k; y].$$

Przy tym staramy się znaleźć takie  $y$ , żeby nie zmieniać wartości wieży, albo (co częstsze) zmienić ją możliwie nieznacznie. Wieżę  $[10 \times k; y]$  nazwiemy *znormalizowaną*. Sprowadzanie dwóch wież do takiej postaci pozwala sprawnie porównać ich wartości – wystarczy porównać wysokości wież znormalizowanych oraz, jeśli wysokości są identyczne, ostatnią liczbę w wieży. Na kilku przykładach zaprezentujemy normalizację.

**Przykład 1.** Rozważmy  $[9; 9]$  i znajdziemy takie  $x$ , dla którego zachodzi  $9^9 = 10^x$ . Oczywiście  $x = \log 9^9 = 9 \log 9 \approx 8,588$ , a więc

$$[9; 9] = [10; 9 \log 9] \approx [10; 8,588].$$

**Przykład 2.** Weźmy  $[9 \times 3]$  i znajdziemy takie  $x$ , że zachodzi  $9^{9^9} = 10^x$ . W tym przypadku  $x = 9^9 \log 9 \geq 10$ . Kolejnym krokiem jest znalezienie takiego  $x_1$ , że  $x = 10^{x_1}$ . Oczywiście  $x_1 = \log x = 9 \log 9 + \log(\log 9) \approx 8,568$ , czyli ostatecznie

$$[9 \times 3] = [10; 10; x_1] \approx [10; 10; 8,568].$$

**Przykład 3.** Rozważmy wreszcie liczbę  $[9 \times 4]$  i postąpmy podobnie jak wcześniej. Mamy kolejno:  $[9 \times 4] = 10^x$ ,  $x = [9 \times 3] \log 9$ ,  $x = 10^{x_1}$ ,  $x_1 = \log x = 9^9 \log 9 + \log(\log 9)$ ,  $x_1 = 10^{x_2}$ ,  $x_2 = \log x_1 = \dots$  I tu napotykamy kłopot, gdyż liczba  $x_1$  jest sumą dwóch liczb, a nie da się rozbić logarytmu sumy. Zamiast tego spójrzmy na składniki  $x_1$  i zauważmy, że zachodzi  $|9^9 \log 9| \gg |\log(\log 9)|$ . (Obie strony rozważamy w modułach, gdyż liczba  $\log \log 9$  jest ujemna.) Istotnie,  $9^9 \log 9 \approx 10^{8,568}$  oraz  $\log(\log 9) \approx -0,02$ . W takim razie zaniedbajmy ten mały składnik. Wtedy  $x_1 \approx 9^9 \log 9$  i ostatecznie  $x'_2 = 9 \log 9 + \log \log 9$  oraz

$$[9 \times 4] \approx [10 \times 3; x'_2] \approx [10 \times 3; 8,568].$$

Różnica między najwyższymi piętrami, to jest między  $x_2$  i  $x'_2$ , wynosi  $|\log(9^9 \log 9 + \log(\log 9)) - (9 \log 9 + \log(\log 9))| < 10^{-10}$ , jest więc relatywnie mała.

Spójrzmy teraz na problem szacowania z nieco innej strony. Najpierw parę narzędzi. Zapiszmy  $\log(x + y) = \log(x \cdot (1 + \frac{y}{x})) = \log x + \log(1 + \frac{y}{x})$  i podstawmy  $z = y/x$ . Następnie rozwińmy drugi składnik w szereg Taylora w punkcie  $z_0 = 0$

$$\log(1 + z) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n \ln 10}.$$

Szereg Taylora pozwala na przedstawienie wartości funkcji  $f$  w pewnym punkcie  $x$  za pomocą wyrażenia podobnego do wielomianowego. Ustala się pewien punkt bazowy  $x_0$ , i wtedy dla wszystkich  $x$  takich, że  $|x - x_0| < R$  dla stosownie dobranego  $R$  można zapisać:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n,$$

gdzie  $f^{(n)}$  oznacza  $n$ -tą pochodną funkcji  $f$ . U nas rozwinięcie w szereg Taylora funkcji  $\log(1+z)$  jest możliwe tylko dla takich  $z$ , dla których  $|z| < 1$ .

Podstawiając wartości z Przykładu 3., otrzymujemy  $z = \frac{\log \log 9}{9^9 \log 9} \approx -5,5 \cdot 10^{-11}$ .

Sprawdźmy, jak wygląda analogiczne przybliżenie dla liczby  $[9 \times 5]$ . W tym przypadku pierwsze przybliżenie stosowane jest do liczb  $x = [9 \times 3] \log 9$  oraz  $y = \log \log 2$ , a więc  $z = \frac{y}{x} \approx -[10; -10; 8,568]$ . Ta liczba jest mała, więc możemy dokonać następującego przybliżenia (tylko pierwszy wyraz szeregu Taylora):  $\log(1+z) \approx \frac{z}{\ln 10}$ , i stwierdzić, że te wartości nie różnią się prawie wcale.

Powyższe przykłady dostarczają nam takiej oto strategii w normalizowaniu wież:

1. Aby wyznaczyć następny wykładnik, należy zlogarytmować ten otrzymany w poprzednim kroku (logarytmowanie dziesiętne).
2. Rozsądne jest stosowanie wspomnianych przybliżeń (szczególnie dla wież o wysokości co najmniej 4) – popełniany w ten sposób błąd jest znikomy dla szacowania ostatniego wykładnika.
3. Powtarzane przybliżenia zawsze prowadzą do opuszczania takiego samego składnika:  $\log \log 9$ , który dla liczb postaci  $[9 \times n]$  jest tym mniejszy od reszty, im większe jest  $n$ .

Korzystając z powyższej strategii, możemy przekonać się, że dla  $n > 2$  zachodzi następująca zależność:

$$(4) \quad [9 \times n] \approx [10 \times (n-1); 8,568].$$

Czy ostatnia liczba w wieży znormalizowanej jest stała, tj. nie zależy od wysokości wieży? Oczywiście dokładne obliczenia pokazują, że tak nie jest, a otrzymane podobieństwo wynika jedynie ze stosowanych przybliżeń. Czy to więc przypadek, czy reguła? Kwestię tę rozwiązuje następujące twierdzenie:

**Twierdzenie 1.** *Mając dane wieże  $[9 \times n]$  i ich postacie znormalizowane  $[10 \times (n-1); x_n]$ , rozważmy ciąg liczbowy  $(x_n)$ . Granica  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$  istnieje.*

Dowód twierdzenia pomijamy, udzielając jednak wskazówki dla Czytelnika Ambitnego – wystarczy wykazać, że ciąg  $(x_n)$  jest malejący. Powróćmy do porównywania wież i skomplikujmy nieco zadanie, dopuszczając działanie silni.

Rozważmy wartości  $[9 \times 22]!$ ,  $[9 \times 21; 9]$  oraz  $[9! \times 14]!$ . Wiemy już, że  $[9 \times 22] \approx [10 \times 21; 8,568]$ , i możemy się przekonać, że  $[9! \times 14] \approx [10 \times 14; 6,305]$ .

Łatwo teraz porównać te liczby oraz ich silnie. Widać, że strategia zwiększania liczb potęgowanych kosztem obniżania wysokości wieży nie opłaca się. Zauważmy ponadto, że nierówność  $[9! \times 21] < [9 \times 22]$  wydaje się na pierwszy rzut oka nieprawdopodobna!

Pozostaje nam jeszcze porównać liczbę  $[9 \times 21; 9!] \approx [10 \times 22; 5,539]$  z pozostałymi. W tym celu oszacujemy liczbę  $[9! \times 14]!$ . Można sprawdzić, że  $[a \times (2n-1)] < [a \times n]^{[a \times n]} < [a \times 2n]$ . Stosując wzór Stirlinga, otrzymujemy

$$[9! \times 14]! \approx [10 \times 14; 6,305]! > [10 \times 14]! > [10 \times 27].$$

Składniki  $e^{[10 \times 14]}$  oraz  $\sqrt{2\pi[10 \times 14]}$  pomijamy, gdyż nie mają one żadnego wpływu na wysokość postaci znormalizowanej.

Jaki jest więc werdykt końcowy? Oto on:

$$[9 \times 21; 9!] < [9! \times 14]! < [9 \times 22]!,$$

przy czym liczba z lewej jest znikoma w porównaniu ze środkową, a liczba środkowa jest znikoma w porównaniu z prawą.

Przedstawimy teraz inną metodę porównywania wież. Nasze rozumowanie przeprowadzimy w sytuacji, gdy bazą nie jest liczba 10, lecz pewna ustalona liczba naturalna  $N > 2$ . Załóżmy mianowicie, że dane są dwie liczby  $A$  i  $B$ :

$$A = [N \times n; y], \quad B = [b_1; \dots; b_n; x],$$

gdzie  $x, y > 1$  (zauważmy, że wieże mają taką samą wysokość). Odpowiemy teraz na następujące pytanie: *co musimy wiedzieć o  $x$  i  $y$ , żeby stwierdzić, że  $A < B$  niezależnie od wyboru liczb  $b_i \in \{2, \dots, N\}$ ?* Tak sformułowane pytanie w istocie upraszcza problem; przyjmijmy najgorszy scenariusz, tj.  $b_i = 2$  dla wszystkich  $i$ .

Każda wskazówka jest dobra, w tym jednak przypadku pokazanie, że ciąg  $x_n$  jest malejący, nie jest natychmiastowe – wymaga dużo ostrożności w obliczeniach i szacowaniach.

Przykład dla  $n = 3$ :

$$a^{a^{a^{a^a}}} < (a^{a^a})^{a^{a^a}} = a^{a^{a \cdot a^{a^a}}} < a^{a^{a^{a^{a^a}}}}.$$

Wzór Stirlinga pozwala przybliżyć silnię dużych liczb za pomocą wyrażenia potęgowego

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

**Twierdzenie 2.** Niech  $K = \log_2 N$ . Jeśli  $x > 2Ky$ , to  $A < B$ .

*Dowód.* Niech  $n = 1$ . Wtedy łatwo sprawdzić, że  $2^x > N^{2y} > N^y$ . Rozważmy teraz  $n > 1$ . Zauważmy, że

Skoro  $N > 2$ , to

$$y > 1 > \log_N(2 \log_2 N)$$

oraz

$$N^{2y} > N^{y + \log_N(2 \log_2 N)} = 2 \log_2 N \cdot N^y.$$

$$2^x > 2^{2Ky} = N^{2y} > 2 \log_2 N \cdot N^y = 2KN^y.$$

Niech teraz  $y' = N^y$  oraz  $x' = 2^x > 2KN^y = 2Ky'$ . Wtedy

$$[N; N; y] = [N; y'] < [2; x'] = [2; 2; x].$$

Kończy to dowód indukcyjny. □

Przyjrzyjmy się teraz następującemu przykładowi. Wiemy już, że  $[9 \times 22] \approx [10 \times 21; 8,568]$ . Zgodnie z Twierdzeniem 2. dla  $N = 9$  oraz  $y = 9$  dowolne  $x > 57,1 > 2 \log_2 9 \cdot 9$  gwarantuje to, że niezależnie od doboru  $b_1, \dots, b_{21}$  wyrażenie  $[b_1; \dots; b_{21}; x]$  będzie większe od  $[9 \times 22]$ . Tym samym

$$[9 \times 22] < [2 \times 21; 58].$$

Jest to kolejna nieprawdopodobna nierówność! Stosując Twierdzenie 2. dla  $N = y = 9!$ , możemy się ponadto przekonać, że

$$2 \log_2 9! \cdot 9! = 13\,404\,157,980 \dots$$

$$[9! \times 21] < [9 \times 20; 13\,404\,158] < [9 \times 20; 9^9] = [9 \times 22],$$

a więc raz jeszcze otrzymujemy nierówność wcześniej uzyskaną inną metodą. Twierdzenie 2. niesie za sobą jeszcze więcej. Dla *dowolnego*  $n > 0$  zachodzą następujące nierówności:

Dруга nierówność to konsekwencja relacji

$$13\,404\,158 < [2 \times 5].$$

- $[9! \times n] < [9 \times (n + 1)]$ ,
- $[9! \times n] < [2 \times (n - 1); [2 \times 5]] = [2 \times (n + 4)]$ .


\* takimi z pewnością są uczniowie startujący w Konkursie Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego (do udziału w którym serdecznie zachęcamy).

Wieżami okresowymi są wyrażenia

$$[3; 2; 3; 2], [4; 2; 3; 4; 2; 3; 4; 2; 3].$$

Na zakończenie kilka potencjalnych problemów dla Czytelników Dociekliwych i Cierpliwych\*.

1. Czy Twierdzenie 1. można uogólnić na przypadek, gdy w wieży wyrazy pojawiają się okresowo?
2. Czy Twierdzenie 2. daje się poprawić tak, aby było stosowne dla wież o *różnych* wysokościach?



## Zobaczyć niewidoczne

Jakub NALEPA\*

\* Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Każdy z nas może z łatwością wymienić zawody, których wykonywanie naraża ludzi na ciągły stres. Często stres jest związany z tym, że decyzje podejmowane w codziennej pracy wpływają na zdrowie (i życie) innych. Strażak, ratownik medyczny, chirurg, pilot, radiolog... Wszyscy muszą działać szybko, a koszt potencjalnych pomyłek może być dramatycznie wysoki. Warto zauważyć, że proces podejmowania decyzji w praktyce polega na analizie różnych danych (w czasie rzeczywistym), np. w przypadku danych medycznych mogą to być różne rodzaje (*modalności*) obrazów, zawierające różne informacje o pacjencie. Zobaczymy, jak sztuczna inteligencja może ułatwić proces podejmowania takich decyzji.