




Rys. 1




Rys. 2




Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6

Liczby zespolone to liczby postaci  $z = a + bi$ , gdzie  $a, b \in \mathbb{R}$ , zaś  $i$  to jednostka urojona,  $i^2 = -1$ . Liczby  $a + bi, c + di$  są równe wtedy i tylko wtedy, gdy  $a = c, b = d$ . Można je reprezentować na płaszczyźnie:  $z = (a, b)$ . Wygodniejszy bywa biegunowy układ współrzędnych, wtedy  $z = (|z|, \varphi)$ , gdzie moduł  $|z| \in \mathbb{R}$  to odległość  $z$  od  $0$ , zaś  $\varphi$  to argument  $z$ : kąt od dodatniej półosi poziomej do wektora  $\vec{0z}$ , z dokładnością do  $360^\circ$  (rys. 1). Kąty zawsze mierzymy antyzegarowo.

Dodajemy zwyczajnie:  $(a + bi) + (c + di) = (a + b) + (c + d)i$ . Mówiąc geometrycznie, liczby zespolone dodajemy tak, jak wektory (rys. 1). Mnożymy też zwyczajnie:  $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$  (bo  $i^2 = -1$ ). Okazuje się, że moduły się mnożą, a argumenty dodaje. Na przykład mnożenie przez  $i = (1, 90^\circ)$  to obrót o  $90^\circ$  (rys. 2). Liczbę odpowiadającą punktowi  $X$  oznaczamy przez  $x$ .

**Fakt 1.** Środek odcinka  $Z_1Z_2$  to  $\frac{1}{2}(z_1 + z_2)$ . Ponadto  $\vec{Z_1Z_2} = z_2 - z_1$  (rys. 1).

**Fakt 2.** Jeśli w kwadracie  $ABCD$  mamy  $a = 0$ , to  $d = ib$  oraz  $c = b + ib$  (rys. 2).

**Fakt 3.** Mnożenie przez  $t = (1, 60^\circ)$  to obrót o  $60^\circ$ . Ponadto  $1 + t^2 = t$  (rys. 3).

Tego typu własności przydają się do rozwiązywania zadań geometrycznych.

**1.** W sytuacji z rysunku 4 oblicz  $\alpha + \beta + \gamma$ .

**R.** Niech  $d = 0$  i  $a = (1, 1)$ . Suma kątów  $\alpha, \beta, \gamma$  to argument iloczynu liczb  $a, b, c$ . Skoro  $abc = (1 + i)(2 + i)(3 + i) = 6 + 11i + 6i^2 + i^3 = 6 + 11i - 6 - i = 10i$  oraz  $\alpha + \beta + \gamma < 360^\circ$ , to  $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$ .  $\square$

**2.** Na bokach  $AB$  i  $AC$  trójkąta  $ABC$  zbudowano, po jego zewnętrznej stronie, kwadraty  $ABDE$  i  $ACFG$ . Punkty  $M$  i  $N$  są odpowiednio środkami odcinków  $DG$  i  $EF$ . Wyznacz możliwe wartości wyrażenia  $MN : BC$ .  
[Zadanie to pochodzi z LIII Olimpiady Matematycznej.]

**R.** Niech  $a = 0$  (rys. 5). Z faktu 2 mamy  $g = ic$  oraz  $f = c + ic$ , a także  $b = ie$  oraz  $d = e + ie$ . Z faktu 1 wyznaczamy  $m = \frac{1}{2}((e + ie) + ic)$  oraz  $n = \frac{1}{2}(e + (c + ic))$ , a także  $\vec{MN} = n - m = \frac{1}{2}(e + c + ic - e - ie - ic) = \frac{1}{2}(c - ie) = \frac{1}{2}\vec{BC}$ . Wynik sam wyszedł!  $MN : BC = 1 : 2$ .  $\square$

**3.** Dane są punkty  $B$  i  $C$ . Punkt  $A$  jest dowolnym punktem ustalonej półpłaszczyzny wyznaczonej przez prostą  $BC$ . Na bokach trójkąta  $ABC$  zbudowano, na zewnątrz, kwadraty  $ABDE$  i  $ACFG$ . Wykaż, że wszystkie tak otrzymane proste  $DF$  przechodzą przez pewien ustalony punkt, zależny tylko od położenia  $B$  i  $C$ .

**R.** Niech  $b = -1$  oraz  $c = 1$  (rys. 6). Wtedy  $d - b = i(a - b)$  oraz  $f - c = -i(a - c)$ , czyli  $d + 1 = ia + i$  oraz  $f - 1 = -ia + i$ . Stąd po dodaniu stronami  $d + f = 2i$ , czyli środek odcinka  $DF$  (z faktu 1 jest nim  $\frac{1}{2}(d + f)$ ) nie zależy od punktu  $A$ .  $\square$

**4.** Trójkąty równoboczne  $A_1B_1C, A_2B_2C$  i  $A_3B_3C$  są zorientowane antyzegarowo. Punkty  $M_1, M_2$  i  $M_3$  są środkami odpowiednio odcinków  $A_2B_3, A_3B_1$  i  $A_1B_2$ . Udowodnij, że trójkąt  $M_1M_2M_3$  jest równoboczny i zorientowany zegarowo.

**R.** Niech  $c = 0$ . Dla  $k = 1, 2, 3$ , z faktu 3 zachodzi  $b_k = ta_k$ , a z faktu 1 mamy  $m_k = \frac{1}{2}(a_{k+1} + ta_{k-1})$ , gdzie  $a_4 = a_1$  i  $a_0 = a_3$ . Stąd i z  $1 + t^2 = t$  nietrudno sprawdzić, że  $(m_3 - m_1)t = m_2 - m_1$ , czyli że  $\vec{M_1M_3} \cdot t = \vec{M_1M_2}$ , co daje tezę.  $\square$

Zadania domowe:

**5.** Trójkąty  $A_1A_2A_3, B_1B_2B_3$  i  $A_kB_kC_k$ , dla  $k = 1, 2, 3$ , są równoboczne i zorientowane antyzegarowo. Wykaż, że trójkąt  $C_1C_2C_3$  także spełnia te warunki.

**6.** Niech  $A = (3, 1), B = (3, -1), C = (7, -1), D = (1, 1), O = (0, 0)$ . Oblicz  $\sphericalangle AOB + \sphericalangle COD$ .

**7. Twierdzenie Napoleona.** Na bokach dowolnego trójkąta zbudowano, na zewnątrz, trójkąty równoboczne. Udowodnij, że ich środki tworzą trójkąt równoboczny.